

L'apport des pairs communautaires dans l'identification et l'accès à l'offre de service VIH aux hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes (HSH) dans la banlieue de Dakar à Mbao du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2022

Ndiaye R. , Diouf C ND. ,Diallo Al. , Thiam A , Bossou K. , Ndour C.T.

1: District sanitaire de Mbao


2: DLSI

3: FHI360

CONTEXTE

- ❖ Prévalence HSH dépasse 27%
- ❖ Pénalisation actes contre nature
- ❖ Stigmatisation et discrimination
- ❖ Contrainte d'atteinte des objectifs d'élimination

District sanitaire de Mbao



OBJECTIFS

Améliorer l'accès aux HSH aux services de dépistage différencié, de prévention ou de traitement.

METHODOLOGIE

❖ Etude:

- transversale et descriptive
- 1^{er} octobre au 31 juillet 2022 chez les HSH
- Quatre pairs HSH formés pour

❖ Méthode

- Données collectées et stockées sur Epi info
- Analyse des données effectuée avec Epi-info 7.1.5.0.

RESULTATS (1)



Figure 1: Dépistage et mise sous traitement

RESULTATS (2)

409 VISITE A DOMICILE Faites




Figure 2: Activités communautaires

DISCUSSIONS (1/2)

- ❖ HSH groupe particulièrement affecté par l'infection par le VIH.
- ❖ Rapports sexuels entre hommes seul mode de contamination qui ne diminue pas
- ❖ Prévalence VIH élevée dans notre étude 23,19%, de même que celle Diallo K. au Sénégal estimée à 27,6 %, mais faible à 8,9% à ougadougou [Dahj T.T.E and co.] et en France 17,7% [Annie V. and co.]
- ❖ Initiation rapide ARV favorise la suppression de la charge virale, mais pas d'impact ni sur la rétention dans les soins, 7,5% des personnes connaissaient leur statut dans l'étude de [Annie V. and co.] dans notre étude elle était de 5,8 %

DISCUSSIONS(2/2)

- ❖ Les relations sexuelles entre hommes, facteur de propagation des IST et du VIH/sida d'où l'importance de la prévention, dans notre la distribution des moyens de prévention était couplé aux visites à domicile, alors dans l'étude de Annie V. les mesures de préventions étaient disponible librement.
- ❖ Contexte africain où l'homosexualité est illégale , la rétention au soins est un défis, dans notre étude 4 HSH avaient catégoriquement refusés les soins au VIH.

CONCLUSION

- ❖ Atteinte de la cible des trois 95 fortement tributaire de la qualité de la prise en charge des populations clés.
- ❖ Stratégies communautaires pour permettre d'améliorer de de soins dans les catégories les plus vulnérables.

REMERCIEMENTS /CONTACTS

- ❖ District sanitaire de MBAO
- ❖ Division de lutte contre le IST/SDIA
- ❖ FHI360